

آبسه بارتولن:

غدد بارتولن در دو طرف سوراخ واژن قرار داد

که این غدد مایعی ترشح می کند که به روان

شدن واژن کمک می کند . گاهی دهانه این

غدد بسته می شود و سبب می شود مایع به

عقب پس زده و به داخل غده برگردد در

نتیجه تورم نسبتا بدون دردی به نامه کیست

بارتولن به وجود می آید اگر مایع درون

کیست عفونی شود آبسه بارتولن ایجاد می

شود که دردناک است . کیست بارتولن بیشتر

زمانها یک طرفه است و در سن ۲۰ تا ۲۹

سالگی ایجاد می شود ولی اگر بعد از ۴۰

سالگی ایجاد شود حتما باید سریعتر به

پزشک مراجعه شود .

نشانه ها: در حالت کیست کوچک بدون درد

است ولی اگر بزرگتر و چرکی شود ممکن است

این نشانه ها را داشته باشد.

۱- درد در هنگام لمس

۲- ناراحتی هنگام نشستن یا راه رفتن

۳- درد در هنگام نزدیکی

۴- تب

علتها:

هر گاه دهانه غده به دلیل رشد پوست یا

عفونت بسته شود .

تشخیص:

توسط معاینه پزشکی تشخیص داده شود ولی در

سن بالای ۴۰ سال ممکن است نمونه برداری هم

لازم باشد.

درمان: بیشتر کیستها نیاز به درمان ندارند و با

روش های ساده ای مثل نشستن در آب گرم به

مدت چند روز خوب می شوند ولی اگر با این روش

خوب نشد و دردناک بود به پزشک مراجعه کند.

ممکن است درمان آنتی بیوتیکی لازم باشد بعضی

موارد تخلیه جراحی هم مورد نیاز است.

مراقبتهای بعد از عمل بارسه بارتولن



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی
خراسان شمالی بجنورد

آبسه بارتولن

آموزش سلامت همگانی

پیشگیری:

با رعایت بهداشت عمومی و بهداشت ناحیه
تناسلی ممکن است بتوان از تکرار دوباره
بیماری جلوگیری کرد.

منبع:

پرستاری داخلی جراحی برونرسودارث -
بیماری های زنان ، پستان ۲ - بیماری های
شایع زنان مانیتا خلیلی پور دارستانی

شماره تلفن بیمارستان:

۰۵۸۳۲۲۳۶۵۵۱ - ۴

سایت بیمارستان:

www.bentolhoda.nkums.ac.ir

کانال آموزش بیمار بیمارستان بنت الهدی:

[@bimarestan-bentolhoda](https://www.instagram.com/bimarestan-bentolhoda)

۱- تا سه روز بعد از عمل روزانه سه تا

چهار بار و هر بار ده تا بیست دقیقه

در لگن آب گرم بنشینید که هم درد

را کم می کند هم به خروج ترشحات

کمک می کند.

۲- استفاده مرتب و کامل آنتی بیوتیکها و

مسکن ها

۳- تا دو هفته نزدیکی نداشته باشید.

۴- اگر سوند یا کاتتری درم حل عمل

گذاشته شد ۴ تا ۶ هفته بعد برای

خارج کردن آن به پزشک مراجعه

نمائید.